

En prenant pour référence la phrase de Marcel Proust : « Du côté de chez Swann » page 343 éditions de la Pléiade et les notices des médicaments figurant dans le Dictionnaire VIDAL, l'auteur Mike The Bike établit un texte sur le Clopidogrel.

Cmax de Clopidogrel chez les malades cirrhotiques est plusieurs fois supérieure à celle des sujets sains

Cependant l'effet du Clopidogrel sur l'agrégation plaquettaire et sur le temps de saignement ont été comparables entre le groupe des sujets sains et les sujets cirrhotiques

Chez les insuffisants rénaux

Le taux d'inhibition de l'agrégation plaquettaire induite par l'ADP est plus faible que chez les sujets sains

Le Clopidogrel est une pro drogue

Le métabolite actif est formé par oxydation du Clopidogrel suivie d'une hydrolyse

Le Clopidogrel est rapidement absorbé par administration orale

Le Clopidogrel subit une bio transformation importante au niveau hépatique

Le principal métabolite est

Dépourvu d'activité pharmacologique

Le Clopidogrel réduit significativement le risque relatif de décès, toutes causes

Et le risque relatif du critère combiné associant la récurrence d'infarctus

Accident vasculaire cérébral ou décès

L'administration répétée de 75 mg par jour

Se traduit par une inhibition importante de l'agrégation plaquettaire

Le surdosage peut conduire à un allongement du temps de saignement et à des complications hémorragiques

Autres effets indésirables peu fréquents

Purpura thrombopénique

Réactions anaphylactoïdes

Confusion

Hallucinations

Troubles du goût

Vascularite

Hypotension

Bronchospasmes

Pneumopathie interstitielle

Pancréatite

Colite

Stomatite

Hépatite

Angio œdème

Eruption bulleuse

Arthralgie

Myalgie

Glomérulonéphrite

Fièvre

Ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse

En cas d'intervention chirurgicale, il convient d'arrêter le traitement 5 jours avant l'intervention

Le Clopidogrel est indiqué chez les malades souffrant d'un infarctus du myocarde

D'un accident vasculaire cérébral ischémique datant de plus de 7 jours

Ou d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs