

En prenant pour référence la phrase de Marcel Proust : « Du côté de chez Swann » page 343 éditions de la Pléiade et les notices des médicaments figurant dans le Dictionnaire VIDAL, l'auteur Mike The Bike établit un texte sur le Ropinirole.

Le Ropinirole est un antiparkinsonien dopaminergique

Le Ropinirole est un agoniste puissant de la dopamine « non ergoline »

Le Ropinirole allie la dépression en dopamine qui caractérise la maladie de Parkinson

Par stimulation des récepteurs dopaminergiques

Le Ropinirol inhibe la sécrétion de prolactine

Par action au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse

Le profil toxicologique est déterminé par l'activité pharmacologique

Modification du comportement

Hypoprolactinémie

Diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque

Ptosis et salivation

L'absorption orale du Ropinirole est rapide

Le Ropinirol est essentiellement éliminé par voie urinaire

En cas de surdosage

Les symptômes liés à l'effet dopaminergique du Ropinirole

Seront atténués par un traitement approprié par les antagonistes dopaminergiques

Tels que les neuroleptiques

Ou la Métopropramide

Des épisodes de jeu pathologique

(Compulsion aux jeux)

Ont été décrits chez les patients atteints de la maladie de Parkinson

Traités par des agonistes dopaminergiques

Hallucinations

Délires

Illusions

Paranoïa

Augmentation de la libido

Utilisation en association à la Lévodopa

Confusion

Hallucinations

Sensations vertigineuses et vertiges

Somnolence

Dyskinésie

Nausées

Douleurs abdominales

Vomissements

Pyrosis

Réaction hépatique

Principalement élévation enzymatique

Œdèmes des membres inférieurs

Le Ropinirole est contre indiqué pendant la grossesse et l'allaitement

Chez les patients recevant du Ropinirole

Il faut ajuster la posologie

Quand des médicaments inhibiteurs du CYP1A2

Sont introduits ou arrêtés

Ciprofloxacine

Enoxacine

Fluvoxamine

La dose initiale recommandée est de 0.25 mg trois fois par jour pendant la 1<sup>ère</sup> semaine

La dose est ensuite augmentée de 0.25 mg par prise

La dose peut être augmentée chaque semaine de 0.5 à 1 mg par prise

Soit 1.5 à 3 mg par jour

Une réponse thérapeutique peut être obtenue pour des doses allant de 3 à 9 mg par jour

La dose de Ropinirole peut être progressivement augmentée jusqu'à 24 mg par jour

Lorsque le Ropinirole est administré en association à la Lévodopa

La dose de Lévodopa peut être progressivement réduite d'environ 20 %

Lorsque le Ropinirole est utilisé en remplacement d'un autre agoniste dopaminergique

Ce dernier doit être arrêté

L'arrêt du traitement doit se faire progressivement

En réduisant le nombre de prises quotidiennes

Sur une période d'une semaine

Le Ropinirole est contre indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30ml/min)